


Nmin-Richtwerte 2023



Bodenklimaraum 50:

- AUR, CLP, FRI, LER, WST, WTM
- Bodenarten: S, IS, I'S, IIS

Bodenklimaraum 52:

- AUR, BRA, CUX, EMD, FRI, LER, WTM
- Bodenarten: u`T, uT, uuT, T, tL

Bodenklimaraum	Schicht cm	Raps kg N _{min} /ha	Winterweizen (Blattvorfrucht) kg N _{min} /ha	Stoppelweizen kg N _{min} /ha	Wintergerste, - Roggen, Triticale kg N _{min} /ha
Nmin-Richtwerte für Winterraps und Wintergetreide (Stand 24.03.2023)					
50 sandige Böden (West)	0-30 cm	9	8	-	8
	30-60 cm	7	8	-	6
	60-90 cm	9	8	-	8
	Gesamt	25 (31)	24 (38)	- (29)	22 (33)
	Spanne	13 - 65	12 - 61	-	10 - 54
52 Marschen, Tonböden	0-30 cm	13	14	10	12
	30-60 cm	13	20	13	14
	60-90 cm	14	20	15	17
	Gesamt	40 (35)	54 (53)	38 (54)	43 (49)
	Spanne	21 - 108	26 - 123	22 - 73	15 - 70

Werte in Klammern: durchschnittliche N_{min}-Richtwerte (5-jähriges Mittel)

Bodenklimaraum	Schicht cm	VF Blattfrucht kg N _{min} /ha	VF Getreide kg N _{min} /ha
Nmin-Richtwerte zu Sommerungen mit Aussaat/Pflanzung im März (Stand: 24.03.2023)			
50 sandige Böden (West)	0-30 cm	9	10
	30-60 cm	8	8
	60-90 cm	10	7
	0-90 cm	27 (31)	25 (32)
	Spanne	9 - 56	12 - 42
52 Marschen, Tonböden	0-30 cm	15	18
	30-60 cm	15	16
	60-90 cm	15	14
	0-90 cm	45 (50)	48 (39)
	Spanne	28 - 62	24 - 93
Nmin-Richtwerte zu Sommerungen mit Aussaat/Pflanzung im April (Stand: 17.04.2023)			
50 sandige Böden (West)	0-30 cm	6	10
	30-60 cm	6	11
	60-90 cm	8	10
	0-90 cm	20 (28)	31 (33)
	Spanne	9 - 52	11 - 80
52 Marschen, Tonböden	0-30 cm	14	15
	30-60 cm	16	17
	60-90 cm	17	13
	0-90 cm	47 (44)	45 (38)
	Spanne	22 - 96	23 - 66

Werte in Klammern: durchschnittliche N_{min}-Richtwerte (3-jähriges Mittel)

Sofern kein aktueller Nmin-Richtwert für das Jahr 2023 angegeben ist, ist der durchschnittliche Nmin-Richtwert anzusetzen.

Quelle: LWK Niedersachsen